

【重要】薬剤情報 印刷仕様変更とご入力順変更のお願い (管理番号：5292)

令和7年10月31日

平素より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度の更新にて、薬剤の下に複数のコメントを入力した際の、薬剤情報（薬情）の印字に関する不適合を修正し、仕様変更を実施いたしました。

この仕様変更に伴い、一部のユーザー様におかれましては、正確な薬情を印刷いただくために**現在の入力順の変更（訂正）が必要**となります。ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。


【 変更が必要な入力パターン（複数行コメント） 】

薬剤の括りの**最終行**に用法以外のコメントが入力されている場合、用法は印字されません。

<例> レセコン診療行為画面と薬剤情報の印字内容>

No.	保険	区分	コード	後	診療内容	数量	単位	点数	回数
1	1	1	21	210103	2 5 m g アリナミンF 糖衣錠	3	錠		
2	1	21	100111		** 分3：毎食後 **	1			
3	1	21	100103		長期収載品と後発医薬品で薬...	1		2 ×	14
4									

令和 7年10月30日 今日のお薬 お名前 山田 太郎 様 Page: 1
(1-1)

薬剤名・飲み方	効能	副作用と相互作用										
2 5 m g アリナミンF 糖衣錠 	ビタミンB1です。神経痛、筋肉痛、しびれなどに用います。											
<table border="1"><thead><tr><th>起</th><th>朝</th><th>昼</th><th>夕</th><th>寝</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 長期収載品と後発医薬品で 速事承認された効能・効 1日3錠 14日分	起	朝	昼	夕	寝							
起	朝	昼	夕	寝								


【 今後の推奨入力パターン（複数行コメント） 】

薬剤の括りの**最終行**に「用法に関するコメント」が来るように、入力順を変更してください。

<例> レセコン診療行為画面と薬剤情報の印字内容>

No.	保険	区分	コード	後	診療内容	数量	単位	点数	回数
1	1	1	21	210103	2 5 m g アリナミンF 糖衣錠	3	錠		
2	1	21	100103		長期収載品と後発医薬品で薬...	1			
3	1	21	100111		** 分3：毎食後 **	1		2 ×	14
4									

令和 7年10月31日 今日のお薬 お名前 山田 太郎 様 Page: 1
(1-1)

薬剤名・飲み方	効能	副作用と相互作用										
2 5 m g アリナミンF 糖衣錠 	ビタミンB1です。神経痛、筋肉痛、しびれなどに用います。											
<table border="1"><thead><tr><th>起</th><th>朝</th><th>昼</th><th>夕</th><th>寝</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table> ** 分3：毎食後 ** 1日3錠 14日分	起	朝	昼	夕	寝		1	1	1			
起	朝	昼	夕	寝								
	1	1	1									

【 変更が不要な入力パターン（用法コメント 1 行のみ） 】

薬剤に対して用法コメント 1 行のみの場合は、従来通り印字されます。

<例> レセコン診療行為画面と薬剤情報の印字内容>

No.	保険	区分	コード	後	診療内容	数量	単位	点数	回数
1	1	1	21	210103	2 5 m g アリナミンF 糖衣錠	3	錠		
2	1	21	100111		** 分 3 : 毎食後 **	1		2 ×	14
3									


令和 7 年 10 月 31 日

今日のお薬

お名前 山田 太郎 様

Page: 1

薬剤名・飲み方	効能	副作用と相互作用
2 5 m g アリナミンF 糖衣錠	ビタミン B 1 です。神経痛、筋肉痛、しびれなどに用います。	



起	朝	昼	夕	寝
	1	1	1	
** 分 3 : 毎食後 **				

1日3錠 14日分

【 変更が不要な入力パターン（用法コメント 1 行と選択式コメントを別々に入力） 】

薬剤に対して用法コメント 1 行のみと、用法以外のコメント（長期収載品の選択式コメント）を別々に入力している場合は、従来通り印字されます。

<例> レセコン診療行為画面>

No.	保険	区分	コード	後	診療内容	数量	単位	点数	回数
1	1	1	21	210103	2 5 m g アリナミンF 糖衣錠	3	錠		
2	1	21	100111		** 分 3 : 毎食後 **	1		2 ×	14
3	1	21	100103		長期収載品と後発医薬品で薬...	1		0 ×	1
4									

<例> レセコン診療行為画面（長期収載品の選択式コメントを F5 登録時に選択入力した場合>

No.	保険	区分	コード	後	診療内容	数量	単位	点数	回数
1	1	1	21	210103	2 5 m g アリナミンF 糖衣錠	3	錠		
2	1	21	100111		** 分 3 : 毎食後 **	1		2 ×	14
3	1	25	240101		調剤料（内服薬・浸煎薬・屯服	1		11 ×	1
4	1	25	240105		処方料（その他）	1		42 ×	1
5	1	21	100103		長期収載品と後発医薬品で薬...	1		0 ×	1
6									


令和 7 年 10 月 31 日

今日のお薬

お名前 山田 太郎 様

Page: 1

薬剤名・飲み方	効能	副作用と相互作用
2 5 m g アリナミンF 糖衣錠	ビタミン B 1 です。神経痛、筋肉痛、しびれなどに用います。	



起	朝	昼	夕	寝
	1	1	1	
** 分 3 : 毎食後 **				

1日3錠 14日分

ご不明な点がございましたら、弊社サポート窓口までお問い合わせください。